

産

後

編



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



編 後 產

著 山 傳

本館據海山仙館
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

產後編目錄

上卷

產後總論

產前後方症宜忌

正產 傷產 調產 催生 凍產 熱產 橫產 盤腸產 難產 死產 下胞 斷臍 新產治法

產後用藥十誤 產後寒熱 胎前患傷寒疫症瘧疾墮胎等症

血塊

血暈

厥症

血崩

氣短似喘

妄言妄見

傷食

忿怒

類瘡

類傷寒二陽症

類傷寒三陰症

類中風

類痿

出汗

盜汗

口渴兼小便不利

遺尿

下卷

誤破尿胞

患淋

便數

瀉

完穀不化

痢

霍亂

嘔逆不食

咳嗽

水腫

流注

膨脹

怔忡驚悸

骨蒸

心痛

腹痛

小腹痛

虛勞

遍身疼痛

腰痛

脅痛

陰痛

惡露

乳瘋

風甚

不語

補編

大便不通

鷄爪風

浮腫

產後編上 共四十三症

陽曲傅 山壽圭手著

產後總論

凡病起於血氣之衰。脾胃之虛。而產後尤甚。是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先。雖有他症。以未治之。斯言盡治產之大旨。若能擴充立方。則治產可無過矣。夫產後憂驚勞倦。氣血暴虛。諸症乘虛易入。如有氣母專耗散。有食母專消導。熱不可用芩連。寒不可用桂附。寒則血塊停滯。熱則新血崩流。至若中虛外感。見三陽表症之多。似可汗也。在產後而用承氣。則重亡陰血。耳聾脅痛。乃腎虛則重竭其陽。見三陰裏症之多。似可下也。在產後而用承氣。則重亡陰血。耳聾脅痛。乃腎虛惡露之停。休用柴胡。謔語出汗。乃元弱似邪之症。非同胃實。厥由陽氣之衰。無分寒熱。非大補不能回陽而起弱。瘕因陰血之虧。不論剛柔。非滋榮不能舒筋而活絡。乍寒乍熱。發作無期。症似瘡也。若以瘡治。遷延難愈。言論無倫。神不守舍。病似邪也。若以邪治。危亡可待。去血過多。而大便燥結。肉菰荈加於生化。非潤腸承氣之能通。去汗過多。而小便短澀。六君子倍加參芪。必生津助液之可利。加參生化湯類服。救產後之危。長生活命丹屢用。甦絕穀之人。

癰疽脫肛。多是氣虛下陷。補中益氣之方。口噤拳攣。乃因血燥類風。加參生化之劑。產戶入風而痛甚。服宜羌活養榮湯。玉門傷涼而不閉。洗宜蠟兒黃硫散。怔忡驚悸。生化湯加以定志。似邪恍惚。安神丸助以歸脾。因氣而悶滿虛煩。生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食。六君子加神麴麥芽爲良。蘇木莪朮。大能破血。青皮枳殼。最消滿脹。一應耗氣破血之劑。汗吐宣下之法。止可施諸壯實。豈宜用於胎產。大抵新產後。先問惡露如何。塊痛未除。不可遽加參朮。腹中痛止。補中益氣無疑。至若亡陽脫汗。氣虛喘促。頻服加參生化湯。是從權也。又如亡陰火熱。血崩厥暈。速煎生化原方。是救急也。王太僕云。治下補下。治以急緩。緩則道路達而力微。急則氣味厚而力重。故治產當遵丹溪而固本。服法宜效太僕以頻加。凡付生死之重寄。須着意於極危。欲求俯仰之無虧。用存心於愛物。此雖未盡產症之詳。然所聞一症。皆援近鄉治驗爲據。亦未必無小補云。

正產

正產者。有腹或痛或止。腰脅酸痛。或勢急而胞未破。名弄胎。服八珍湯。加香附自安。有胞破數日而痛尙緩。亦服上藥俟之。

傷產

傷產者。胎未足月。有所傷動。或腹痛臍痛。或服催生藥太早。或產母努力太過。逼兒錯路。不能正產。故臨月必舉動從容。不可多睡飽食飲酒。但覺腹中動轉。卽正身仰臥。待兒轉順。與其臨時費力。不如先時慎重。

調產

調產者。產母臨月擇穩婆。辦器用。備參藥。產時不可多人喧鬧。二人扶身。或憑物站。心煩用滾水調白蜜一匙。獨活湯更妙。或飢服糜粥少許。勿令飢渴。有生息未順者。只說有雙胎。或胎衣不下。忽令產母驚恐。

催生

催生者。因坐草太早。困倦難產。用八珍湯。稍佐以香附乳香。以助血氣。胞衣早破。漿血已乾。亦用八珍湯。

凍產

凍產者。天寒血氣凝滯。不能速生。故衣裳宜厚。產室宜煖。背心下體尤要。

熱產

熱產者。暑月宜溫涼得宜。若產室人衆。熱氣蒸逼。致頭痛面赤昏暈等症。宜飲清水少許。以

解之。然風雨陰涼，亦當避之。

橫產

橫產者，兒居母腹，頭上足下。產時則頭向下。產母若用力逼之，胎轉至半而橫。當令產母安然仰臥，令其自順。穩婆以中指挾其肩，勿使臍帶羈絆，用催生藥，努力卽生。

當歸

紫蘇各三錢

長流水煎服卽下。

一方用好京墨磨服之卽下。

一方用敗筆頭一個，火鍛以藕節自然汁調服之卽下。

一方用益母草六兩，濃煎，加重便一大杯，調服卽下。

盤腸產

盤腸產者，產則子腸先出，然後生子。其腸或未卽收，以草麻子四十九粒，研碎塗頭上，腸收急急洗去，遲則有害。又方止用四十粒，去皮研爲膏，塗頂中，收卽拭之。如腸燥，以磨刀水潤之，再用磁石煎湯服之，須陰陽家用過有驗者。

難產

難產者，交骨不開，不能生產也。服加味芎歸湯，良久卽下。

小川芎_{兩一}當歸_{兩一}敗龜版_{酒炙一個}婦人髮灰_{一握}須用生過男女者爲末水一鍾煎七分服。

死產

死產者子死腹中也。驗母舌青黑其胎已死。先用平胃散一服。酒水各一鍾。煎八分。投朴硝煎服卽下。用童便亦好。後用補劑調理。

下胞

胞衣不下。用滾酒送下失笑散一劑。或益母丸。或生化湯送鹿角灰一錢。或以產母髮入口作吐。胞衣卽出。有氣虛不能送出者。腹必脹痛。單用生化湯。

全當歸_{兩一}川芎_{錢三}白朮_{錢一}香附_{錢一}加入參_{錢三}更妙。用水煎服。

一方用草麻子二兩。雄黃二錢。研膏塗足下湧泉穴。衣下急速洗去。

平胃散

南蒼朮_{米泔水浸炒}厚朴_{薑炒}陳皮炙草_{各二錢}

共爲粗末。或水煎。或酒煎。煎成時加朴硝_{錢二}。再煎一二沸。溫服。

失笑散

五靈脂蒲黃俱研爲細末。每服三錢。熱酒下。

斷臍

斷臍必以綿裹咬斷爲妙。如遇天寒或因難產。母子勞倦。宜以大麻油紙燃。徐徐燒斷。以助元氣。雖兒已死。令煖氣入臍。多得生。切勿以刀斷之。

滑胎散。臨月常服數劑。以便易生。

當歸錢三五

川芎錢五七

杜仲錢二

熟地錢三

枳殼分七

山藥錢二

水二鍾

煎八分

食前溫服

如氣體虛

弱人。加人參白朮。隨宜服之。如便實多滯者。加牛膝二錢。

治產祕驗良方

治橫生逆產。至數日不下。一服卽下。有未足月。忽然胎動。一服卽安。或臨月先服一服。保

護無虞。更能治胎死腹中。及小產傷胎無乳者。一服卽如原體。

全當歸

川芎各錢一錢

川貝母錢一錢

去心荊芥穗

黃芪各錢八

厚朴炒薑

蘼艾

紅花各錢七

兔絲

子錢二

白芍冬月不用

枳殼六分

羌活六分

甘草五分

上十三味。只用十二味。不可加減。安胎去紅花。催生去蘼艾。用井水鍾半。薑二片爲引。熱

服。渣用水一鍾。煎半鍾。熱服。如不好。再用水一鍾。煎半鍾。服之卽效。不用二劑。

催生兔腦丸。治橫生逆產神效。

催生兔腦丸。治橫生逆產神效。

臘月兔腦髓_{一錢}。母丁香_{一錢}。乳香_{一錢}。另研麝香_{一分}。兔腦爲丸。芡實大。陰乾密封。用時以溫酒送下一丸。

奪命丹

臨產未產時。目反口噤。面黑唇青。口中吐沫。命在須臾。若臉面微紅。子死母活。急用蛇退。蠶故子_{燒灰不存性}。髮灰_{錢一分}。乳香_{五分}。共爲細末。酒下。

加味芎歸湯。治子宮不收。產門不閉。

人參_{二錢}。黃芪_{一錢}。川芎_{一錢}。當歸_{二錢}。升麻_{八分}。炙草_{四分}。五味子_{十五粒}。再不收。加半夏_{八分}。白芍_{八分}。酒炒。

新產治法

生化湯先連進二服。若胎前素弱。婦人見危症。熱症墮胎。不可拘帖數服。至病退乃止。若產時勞甚。血崩形脫。卽加人參三四錢在內。頻服無虞。若氣促亦加人參。加參於生化湯者。血塊無滯。不可以參爲補而弗用也。有治產不用當歸者。見偏之甚。此方處置萬全。必無一失。世以四物湯治產。地黃性寒滯血。芍藥微酸無補。伐傷生氣。誤甚。

產後用藥十誤

一因氣不舒。而誤用耗氣順氣等藥。反增飽悶。陳皮用至五分。禁枳實厚朴。

二因傷氣。而誤用消導。反損胃氣至絕穀。禁枳殼、大黃、蓬、稜、麴、朴。

三因身熱。而誤用寒涼。必致損胃增熱。禁芩、連、梔、柏、升、紫。

四因日內未曾服生化湯。勿用參、芪、朮。以致塊痛不消。

五毋用地黃。以滯惡露。

六毋獨用枳殼、牛膝。枳實以消塊。

七便秘。毋用大黃、芒硝。

八毋用蘇木、稜、蓬以行塊。芍藥能伐氣。不可用。

九毋獨用山查湯。以攻塊定痛而反損新血。

十毋輕服濟坤丹。以下胎下胞。

產後危疾諸症。當頻服生化湯。隨症加減。照依方論。

產後寒熱。

凡新產後。榮衛俱虛。易發寒熱。身痛腹痛。決不可妄投發散之劑。當用生化湯爲主。稍佐發散之藥。產後脾虛。易於停食。以致身熱。世人見有身熱。便以爲外感。遽然發汗。速亡甚矣。當於生化湯中。加扶脾消食之藥。大抵產後。先宜補血。次補氣。若偏補氣。而專用參、芪。

非善也。產後補虛。用參芪芎歸白朮陳皮炙草。熱輕則用茯苓淡滲之藥。其熱自除。重則加乾薑。或云大熱而用薑何也。曰此熱非有餘之熱。乃陰虛內生熱耳。蓋乾薑能入肺分。利肺氣。又能入肝分。引衆藥生血。然必與陰血藥同用之。產後惡寒發熱。腹痛者。當主惡血。若腹不痛。非惡血也。

產後寒熱。口眼歪邪。此乃氣血虛甚。以大補爲主。左手脈不足。補血藥多於補氣藥。右手脈不足。補氣藥多於補血藥。切不可用小續命等發散之藥。

胎前患傷寒疫症。瘧疾。墮胎等症。

胎前或患傷寒疫症。瘧疾。熱久必致墮胎。墮後愈增熱。因熱消陰血。而又繼產失血。故也。治者甚勿妄論傷寒瘧疫未除。誤投梔子豉湯紫苓連柏等藥。雖或往來潮熱。大小便秘。五苓承氣等藥。斷不可用。只重產輕邪。大補氣血。頻服生化湯。如形脫氣脫。加生脈散。以防血暈。蓋川芎味辛能散。乾薑能除虛火熱。雖有便秘煩渴等症。只多服生化湯。自津液生而二便通矣。若熱用寒劑。愈虛中氣。誤甚。

產後諸症治法

血塊第一

此症勿拘古方。妄用蘇木、蓬、稜，以輕人命。其一應散血方，破血藥俱禁用。雖山查性緩，亦能害命，不可擅用。惟生化湯係血塊聖藥也。

生化湯原方

當歸錢_八、川芎錢_三、桃仁皮尖_{十四粒}、去黑薑_{五分}、炙草_{五分}、用黃酒童便各半煎服。

又益母丸、鹿角灰，就用生化湯送下一錢。外用烘熱衣服，煖和塊痛處。雖大暑亦要和煖。塊痛處有氣不運，而暈迷厥，切不可妄說惡血搶心。只服生化湯爲妙。俗有生地牛膝行血、山稜、蓬朮敗血、山查、沙糖消塊、蘄艾椒酒定痛，反致昏暈等症，切不可妄用。二三四日內覺痛減，可揉，乃虛痛也。宜加參生化湯。

肉桂一作三分。

如七日內，或因寒涼食物，結塊痛甚者，加入肉桂八分於生化湯內。如血塊未消，不可加參芪。用之則痛不止。總之慎勿用峻利藥。勿多飲薑椒艾酒。頻服生化湯行氣助血。外用熱衣以煖腹。如用紅花以行之。蘇木、牛膝以攻之，則誤。其胎氣脹，用烏藥、香附以順之。枳殼、厚朴以舒之。甚有青皮、枳實、蘇子以下氣定喘。芩連、梔子、黃柏以退熱除煩。至於血結更甚，反用承氣湯下之而愈結。汗多、小便短濇，反用五苓散通之而愈祕。非徒無益，而又害之也。凡兒生下，或停血不下，半月外尙痛，或外加腫毒高寸許，或身熱減飲食，倦甚，必用生化湯。

加三稜、蓬朮、肉桂等，攻補兼治。其塊自消。如虛甚，食少泄瀉，只服此帖定痛。且健脾胃，進食止瀉。然後服消塊湯。

加味生化湯治血塊日久不消，半月後方可用之。

川芎一錢、當歸三錢、肉薑四分、桃仁十五粒、三稜醋炒，六分、元胡六分、肉桂六分、炙草四分。

血暈第二

分娩之後，眼見黑花，頭眩昏暈，不省人事者，一因勞倦甚而氣竭神昏，二因大脫血而氣欲絕，三因痰火乘虛泛上而神不守。當急服生化湯二三帖。外用韭菜細切，納有嘴瓶中，用滾醋二鍾，沖入瓶內，急沖產母鼻中，即醒。若偏信古方，認爲惡血搶心，而輕用散血之劑，認爲疫火，而用無補消降之方，誤甚矣。

如暈厥牙關緊閉，速煎生化湯，挖開口，將鵝毛探喉，洒盞盛而灌之。如灌下腹中漸溫暖，不可拘帖數。外用熱手在單衣上，從心揉按至腹，常熱火煖之。一兩時服生化湯四帖完，即神清。始少緩藥方進粥。服至十服而安。故犯此者，連灌藥火煖，不可棄而不救。若在冬月，婦人身欠煖，亦有大害。臨產時，必預煎生化湯，預燒稱錘硬石子候兒下地，連服二三帖。又產婦枕邊行醋韭投醋瓶之法，決無暈症。又兒生時，合家不可喜子而慢母，產母不可顧子忘倦。

又不可產訖卽臥。或忿怒逆氣。皆致血暈。慎之慎之。

加味生化湯治產後三等血暈症

川芎_{錢三}當歸_{錢六}黑薑_{錢四}桃仁_{粒十}炙草_{分五}荆芥_{分四}炒黑大棗水煎服。

勞倦甚而暈。及血崩氣脫而暈。並宜速灌兩服。如形色脫。或汗出而脫。皆急服一帖。卽加人參三四錢。一加肉桂四分。決不可疑參爲補而緩服。痰火乘虛泛上而暈。方內加橘紅四分。虛甚加人參二錢。肥人多痰。再加竹瀝七分。薑汁少許。總不可用稜朮破血等方。其血塊痛甚。兼送益母丸。或鹿角灰。或元胡散。或獨勝散。上消血塊方。服一服卽效。不必易方從權救急。

加參生化湯治產後形色脫暈。或汗多脫暈。

人參_{三錢有倍加}川芎_{錢二}當歸_{錢五}炙草_{分四}桃仁_{粒十}炮薑_{分四}大棗水煎服。

脈脫形脫將絕之症。必服此方。加參四五錢。頻頻灌之。產後血崩血暈兼汗多。宜服此方。無汗不脫。只服本方。不必加參。左尺脈脫亦加參。此方治產後危急諸症。可通用。一晝一夜。必須服三四劑。若照常症服。豈能接將絕之氣血。扶危急之變症耶。產後一二日血塊痛雖未止。產婦氣血虛脫。或暈或厥。或汗多或形脫。口氣漸涼。煩渴不止。或氣喘急。無論

塊痛。從權用加參生化湯。病勢稍退。又當減參。且服生化湯。

加減法。血塊痛甚。加肉桂七分。渴加麥多一錢。五味十粒。汗多加麻黃根一錢。如血塊不痛。加炙黃芪一錢以止汗。傷飯食麵食。加炒神麴一錢。麥芽五分炒。傷肉食。加山查五個。砂仁四錢炒。

厥症第三

婦人產後用力過多。勞倦傷脾。故逆冷而厥。氣上胸滿。脈去形脫。非大補不可。豈錢數川芎當歸能回陽復神乎。必用加參生化湯。倍參進二劑。則氣血旺而神自生矣。厥自止矣。若服藥而反渴。另有生脈散。獨參代茶飲。救臟之燥。如四肢逆冷又泄痢。類傷寒陰症。又難用四逆湯。必用倍參生化湯。加附子一片。可以回陽止逆。又可以行參歸之力。立二方於左。分先後。

加參生化湯。治產後發厥。塊痛未止。不可加芪朮。

川芎^{二錢}當歸^{四錢}炙草^{五分}炮薑^{四分}桃仁^{十粒}去皮尖研人參^{二錢}棗水煎進二服。

滋榮益氣復神湯。治產後發厥。問塊痛已除。可服此方。

人參^{三錢}黃芪^{一錢}蜜炙白朮^{一錢}炒當歸^{三錢}炙草^{四分}陳皮^{四分}五味^{十粒}川芎^{一錢}熟地^{一錢}麥芽^{一錢}棗

炮一作黑。

一枚。水煎服。

手足冷加附子五分。汗多加麻黃根一錢。熟棗仁一錢。妄言妄見加益智柏子仁龍眼肉。大便秘實加肉蓯蓉二錢。大抵產後暈厥二症相類。但暈在臨盆。症急甚於厥。宜頻服生化湯幾帖。塊化血旺。神清暈止。若多氣促形脫等症。必加參芪。厥在分娩之後。宜倍參生化湯。止厥以復神。並補氣血也。非如上偏補氣血而可愈也。要知暈有塊痛。芪朮不可加。厥症若無塊痛。芪朮地黃並用無疑也。

血崩第四

產後血大來。審血色之紅紫。視形色之虛實。如血紫有塊。乃當去其敗血也。止留作痛。不可論崩。如鮮紅之血。乃是驚傷心。不能生血。怒傷肝。不能藏血。勞傷脾。不能統血。俱不能歸經耳。當以崩治。先服生化湯幾帖。則行中自有補血。凝氣生。若形脫汗多氣促。宜服倍參生化湯幾帖。以益氣。非棕灰之可止者。如產後半月外崩。又宜升舉大補湯治之。此症虛極。服藥平穩。未見速效。須二十帖後。諸症頓除。

生血止崩湯。治產後血崩。

凡止崩用荆芥。俱宜炒黑。

川芎。錢一。
錢當歸。錢四。
黑薑。錢四。
炙草。錢五。
桃仁。粒十。
荆芥。炒黑。五分。
烏梅。煨灰。五分。
蒲黃。炒。五分。
棗水煎。忌薑椒。

熱物生冷。

鮮紅血大來。荊芥穗炒黑。白芷各五分。血竭形敗。加參三四錢。汗多氣促。亦加參三四錢。無汗形不脫。氣促。只服生化湯。多服則血自平。有言歸芎但能活血。甚誤。

升舉大補湯。滋榮益氣。如有塊動。只服前方。芪朮勿用。

黃芪。白朮。陳皮。各四分。人參。二錢。炙草。升麻。各四分。當歸。熟地。各二錢。麥冬。一錢。川芎。一錢。白

芷。四分。黃連。三分。荊芥穗。炒黑四分。

汗多。加麻黃根一錢。浮麥炒一小撮。大便不通。加肉蓯蓉一錢。禁用大黃。有氣。磨木香三分。痰。加貝母六分。竹瀝薑汁少許。寒嗽。加杏仁十粒。桔梗五分。知母一錢。驚。加棗仁。柏子仁各一錢。傷飯。加神麴麥芽各一錢。傷肉食。加山查砂仁各八分。俱加棗水煎。身熱不可。加連柏。傷食怒氣。均不可專用耗散無補藥。凡年老虛人患崩。宜升舉大補湯。

氣短似喘第五

因血脫勞甚。氣無所恃。呼吸止息。違其常度。有認爲痰火。反用散氣化痰之方。誤人性命。當以大補血爲主。如有塊。不可用參芪朮。無塊。方可用本方。去桃仁加熟地。並附子一片。足冷。加熟附子一錢。及參朮陳皮。接續補氣養榮湯。

加參生化湯治分娩下卽患氣短者有塊不可加芩朮。

川芎錢二當歸錢四炙草五分黑薑分桃仁皮十粒去人參錢二引加棗一枚連進二三帖後再用後

方。

補氣養榮湯治產後氣短促血塊不痛宜服此方。

黃芪錢一白朮錢一當歸錢四人參錢三陳皮分炙草分熟地錢二川芎錢二黑薑分如手足冷加熟

黃芪白朮一作各二錢凡止汗用浮麥宜炒。

附子一錢汗多加麻黃根一錢浮麥一小撮渴加麥冬一錢五味子十粒大便不通加肉蓯蓉一錢麻仁一撮傷麵飯加炒神麴一錢炒麥芽一錢傷肉食加山查砂仁各五分。

按麥芽有回乳之害用者慎之。

妄言妄見第六

由氣血虛神魂無依也。治當論塊痛有無緩急。若塊痛未除先服生化湯二三帖痛止繼服加參生化湯或補中益氣湯加安神定志丸湯丸調服之。若產日久形氣俱不足卽當大補氣血安神定志服至藥力充足其病自愈勿謂邪祟若噴以法水驚之每至不救屢治此症服藥至十數帖方效病虛似邪欲除其邪先補其虛先調其氣次論諸病此古人治產後虛症及年老虛喘弱人妄言所當用心也。

安神生化湯治產後塊痛未止。妄言妄見症。未可用芪朮。

川芎錢一。柏子仁錢一。人參錢二。當歸錢三。茯神錢二。桃仁粒十二。黑薑分四。炙草分四。益智分八。陳皮分三。棗水煎。

滋榮益氣復神湯塊痛已止。妄言妄見服此方即愈。

黃芪。白朮。麥冬。川芎。柏子仁。茯神。益智各一錢。人參。熟地各二錢。陳皮分三。炙草分四。棗仁錢一。五味子粒十。蓮子枚八。元肉個八。棗水煎服。

產後血崩血脫。氣喘氣脫。神脫妄言。雖有血氣陰陽之分。其精散神去一也。比量後少緩。亦危症也。若非厚藥頻服。失之者多矣。誤論氣實痰火者非也。新產有血塊痛。並用加參生化湯。行中有補。斯免滯血血暈之失也。其塊痛止。宜用升舉大補湯。少佐黃連。墜火以治血脫。安血歸經也。宜用倍參補中益氣湯。少佐附子。助參以治氣脫。攝氣歸淵也。宜用滋榮益氣復神湯。少佐痰劑。以清心火。安君主之官也。

傷食第七

新產後禁膏粱。遠厚味。如飲食不節。必傷脾胃。治當扶元。溫補氣血。健脾胃。審傷何物。加以消導諸藥。生化湯加神麴麥芽。以消麵食。加山查砂仁。以消肉食。如寒冷之物。加吳萸肉桂。

如產母虛甚。加人參白朮。又有塊然後消補並治。無有不安者。屢見治者不重產後之弱。惟知速消傷物。反損真氣。益增滿悶。可不慎哉。

加味生化湯。治血塊未消。服此以消食。

川芎_{錢二}。當歸_{錢五}。黑薑_{分四}。炙草_{分五}。桃仁_{粒十}。

問傷何物。加法如前煎服。

健脾消食生化湯。治血塊已除。服此消食。

川芎_{錢一}。人參_{錢一}。當歸_{錢各二}。白朮_{錢一}。炙草_{錢五}。

審傷何物。加法如前。

如停塞物。日久脾胃虛弱。恐藥不能運用。可用揉按。炒神麴熨之更妙。凡傷食誤用消導藥。及絕粥幾日者。宜服此方。

長生活命丹

人參三錢。水一鍾半。煎半鍾。先用參湯一盞。以米飯鍋焦研粉三匙。漸漸加參湯。鍋焦粉引開胃口。煎參湯用新罐或銅杓。恐聞藥氣要嘔也。如服寒藥傷者。加薑三大片煎湯。人參名活命草。鍋焦名活命丹。此方曾活數十人。

忿怒第八

產後怒氣逆。胸膈不利。血塊又痛。宜用生化湯去桃仁。服時磨木香二分在內。則塊化怒散。不相悖也。若輕產重氣。偏用木香烏藥枳殼砂仁之類。則元氣反損。益增滿悶。又加怒後卽食。胃弱停悶。當審何物。治法如前。慎勿用木香檳榔丸。流氣引子之方。使虛弱愈甚也。

木香生化湯。治產後血塊已除。因受氣者。

川芎。錢二。當歸。錢六。陳皮。錢三。黑薑。錢四。服時磨木香二分在內。此方減桃仁。用木香陳皮。前有減

乾薑者詳之。

健脾化食散氣湯。治受氣傷食無塊痛者。

白朮。錢二。當歸。錢二。川芎。錢一。黑薑。錢四。人參。錢二。陳皮。錢三。

陳皮一作三分。
又有炙草四分。
存參。

審傷何物。加法如前。大抵產後忿怒氣逆及停食二症。善治者重產而輕怒氣。消食必以補氣血爲先。佐以調肝順氣。則怒鬱散而元不損。佐以健脾消導。則停食行而思穀矣。若專理氣消食。非徒無益而又害之。

類瘡第九

產後寒熱往來。每日應期而發。其症似瘡而不可作瘡治。夫氣血虛而寒熱更作。元氣虛而

外邪或侵。或嚴寒或極熱。或晝輕夜重。或日晡寒熱。絕類瘧症。治當滋榮益氣。以退寒熱。有汗急宜止。或加麻黃根之類。只頭有汗而不及於足。乃孤陽絕陰之危症。當加地黃當歸之類。如陽明無惡寒。頭痛無汗。且與生化湯加羌活防風連鬚葱白數根以散之。其柴胡清肝飲等方。常山草菓等藥。俱不可用。

滋榮養氣扶正湯。治產後寒熱有汗。午後應期發者。

人參_{錢二}。炙黃芪。白朮。川芎。熟地。麥冬。麻黃根_{錢各一}。當歸_{錢三}。陳皮_{錢四}。炙草_{錢五}。

水煎。

加減養胃湯。治產後寒熱往來。頭痛無汗。類瘧者。

炙草_{錢四}。白茯苓_{錢一}。半夏_{錢八分}。川芎_{錢一}。陳皮_{錢四}。當歸_{錢二}。蒼朮_{錢一}。藿香_{錢四}。人參_{錢一}。

薑引煎服。有痰加竹瀝。薑汁半夏神麴。弱人兼服河車丸。凡久瘧不愈。兼服參朮膏以助藥力。

參朮膏

白朮_{斤一}。米泔浸一宿。剉焙。人參_{兩一}。用水六碗。煎二碗。再煎二次。共汁六碗。合在一處。將藥汁又熬成一碗。空心米湯化半酒盞。

類傷寒二陽症第十

產後七日內發熱頭痛惡寒。毋專論傷寒爲太陽症。發熱頭痛脅痛。毋專論傷寒爲少陽症。二症皆由氣血兩虛。陰陽不和。而類外感。治者慎勿輕產後熱悶。而用麻黃湯。以治類太陽症。又勿用柴胡湯。以治類少陽症。且產母脫血之後。而重發其汗。虛虛之禍。可勝言哉。昔仲景云。亡血家不可發汗。丹溪云。產後切不可發表。二先生非謂產後真無傷寒之兼症也。非謂麻黃湯柴胡湯之不可對症也。誠恐後輩學業偏門而輕產。執成方而發表耳。誰知產後真感風感寒。生化中芎藭亦能散之乎。

加味生化湯治產後三日內發熱頭痛症

一本無桃仁。有黑薑四分。

川芎。防風。各一錢。當歸。三錢。炙草。四分。桃仁。十粒。羌活。四分。

查刊本去桃仁。然必須問有塊痛與否。方可議去。服二帖後頭仍痛身仍熱。加白芷八分。細辛四分。如發熱不退。頭痛如故。加連鬚葱五個。人參三錢。產後敗血不散。亦能作寒作熱。何以辨之。曰。時有刺痛者。敗血也。但寒熱無他症者。陰陽不和也。刺痛用當歸。乃和血之藥。若乃積血而刺痛者。宜用紅花桃仁歸尾之類。

類傷寒三陰症第十一

潮熱有汗。大便不通。母專論爲陽明症。口燥咽乾而渴。母專論爲少陰症。腹滿。液乾。大便實。母專論爲太陰症。又汗出。譫語。便閉。母專論爲腸胃中燥。糞宜下症。數症多由勞倦傷脾。運化稽遲。氣血枯槁。腸腑燥涸。乃虛症類實。當補之症。治者勿執偏門輕產。而妄議三承氣湯。以治類三陰之症也。間有少壯產後妄下。幸而無妨。虛弱產婦。亦復妄下。多致不救。屢見妄下成膨。誤導反結。又有血少。數日不通。而卽下致瀉不止者。危哉。婦人良方云。產後大便秘。若計其日期。飯食數多。卽用藥通之。禍在反掌。必待腹滿覺脹。欲去不能者。反結在直腸。宜用豬膽汁潤之。若日期雖久。飲食如常。腹中如故。只用補劑而已。若服苦寒疏通。反傷中氣。通而不止。或成痞滿。誤矣。

養正通幽湯治產後大便秘結類傷寒三陰症

川芎二錢

當歸六錢

炙草五分

桃仁_{粒十}

五
麻仁。

炒二錢
肉

從蓉甲酒

一洗錢去汗

多便實

加黃芪

錢一麻

與

以上數等大便燥結症。非用當歸人參至斤數。難取功效。大抵產後虛中傷寒。口傷食物。

外症雖見頭痛發熱。或脅痛腰痛。是外感宜汗。猶當重產。亡血禁汗。惟宜生化湯。量爲加減。調理無失。又如大便秘結。猶當重產。亡血禁下。宜養正助血通滯。則穩當矣。

又潤腸粥治產後日久大便不通。

芝麻一升研末。和米二合煮粥食。腸潤即通。

類中風第十二

產後氣血暴虛。百骸少血濡養。忽然口噤牙緊。手足筋脈拘攣等症。類中風癱瘓。雖虛火泛上有痰。皆當以未治之。勿執偏門而用治風消痰之方。以重虛產婦也。治法當先服生化湯。以生旺新血。如見危症。三服後即用加參益氣以救血脫也。如有痰火。少佐橘紅炒苓之類。竹瀝薑汁亦可加之。黃柏黃連切不可並用。慎之。

滋榮活絡湯治產後血少口噤項強筋攣類風症。

川芎半錢。

當歸各四錢。

熟地。

人參各二錢。

黃芪。

茯神。

天麻各一錢。

炙草。

陳皮。

荊芥穗。

防風。

羌活各四分。

黃連八分。

薑汁炒。

有痰。

加竹瀝薑汁半夏。

渴。

加麥冬葛根。

有食。

加山查砂仁。

以消肉食。神麴麥芽以消飯食。大便閉。加肉蓯蓉一錢半。汗多。加麻黃根一錢。驚悸。加棗仁一錢。

天麻丸治產後中風恍惚語澀四肢不利。

一本棗仁用一錢。細辛用四分。
天麻錢一。防風錢一。川芎分七。羌活分七。人參。遠志。柏子仁。山藥。麥冬錢各一。棗仁兩。細辛。兩。南星麴分八。石菖蒲錢一。研細末。煉蜜爲丸。辰砂爲衣。清湯下六七十丸。

類瘧第十三

產後汗多。卽變瘧者。項強而身反。氣息如絕。宜速服加減生化湯。

加減生化湯專治有汗變瘧者。

一本引用生薑一片棗一枚。

川芎。麻黃根錢各一。當歸分四。桂枝分五。人參錢一。炙草分五。羌活分五。天麻分八。附子片一。羚羊角分八。如無汗類瘧者。中風用川芎錢三。當歸酒洗。棗仁。防風分量。

出汗第十四

凡分娩時。汗出由勞傷脾。驚傷心。恐傷肝也。產婦多兼三者而汗出。不可卽用斂汗之劑。神定而汗自止。若血塊作痛。芪朮未可遽加。宜服生化湯二三帖。以消塊痛。隨繼服加參生化湯。以止虛汗。若分娩後倦甚。澀澀然汗出。形色又脫。乃亡陽脫汗也。汗本亡陽。陽亡則陰隨之。故又當從權。速灌加參生化湯。倍參以救危惡。毋拘塊痛。婦人產多汗。當健脾以斂水液之精。益榮衛以嘯血歸源。灌漑四肢。不使妄行。雜症雖有自汗盜汗之分。然當歸六黃湯不

可治產後之盜汗也。並宜服加參生化湯。及加味補中益氣二方。若服參芪而汗多不止。及頭出汗而不至腰足。必難療矣。如汗出而手拭不及者。不治。產後汗出氣喘等症。虛之極也。不受補者不治。

麻黃根湯治產後虛汗不止

人參二錢當歸二錢黃芪半錢白朮一錢桂枝五分麻黃根一錢粉草五分牡蠣研少浮麥一大

虛脫汗多手足冷。加黑薑四分。熟附子一片。渴加麥冬一錢。五味十粒。肥白人產後多汗。加竹瀝一盞。薑汁一小匙。以清痰火。惡風寒。加防風桂枝各五分。血塊不落。加熟地三錢。晚服八味地黃丸。

山茱萸。山藥。丹皮。雲苓各八錢澤瀉五錢熟地八錢五味子五錢炙黃芪兩

煉蜜爲丸。陽加於陰。則汗因而遇風。變爲痙癇者。有之。尤難治。故汗多宜謹避風寒。汗多小便不通。乃亡津液故也。勿用利水藥。

盜汗第十五

產後睡中汗出。醒來卽止。猶盜賊人睡而謂之盜汗。非汗自至之比。雜症論云。自汗陽虧。盜汗陰虛。然當歸六黃湯。又非產後盜汗方也。惟兼氣血而調治之。乃爲得耳。

止汗散治產後盜汗

人參錢二當歸錢二熟地半錢麻黃根五分黃連五分酒炒浮小麥一大撮棗一枚

又方

牡蠣煅細末小麥麵炒黃研末

一本牡蠣小麥
炒黃各五分空
心調服

口渴兼小便不利第十六

產後煩燥咽乾而渴兼小便不利由失血汗多所致治當助脾益肺升舉氣血則陽升陰降水入經而爲血爲液穀入胃而氣長脈行自然津液生而便調利矣若認口渴爲火而用芩連梔柏以降之認小便不利爲水滯而用五苓散以通之皆失治也必因其勞損而溫之益之因其留滯而濡之行之則庶幾矣

生津止渴益水飲

人參 麥冬 當歸 生地各三錢黃芪錢一葛根錢一升麻 炙草各四分茯苓八分五味子十五粒

汗多加麻黃根一錢浮小麥一大撮大便燥加肉蓯蓉一錢五分渴甚加生脈散不可疑而不用

遺尿第十七

氣血太虛。不能約束。宜八珍湯加升麻柴胡。甚者加熟附子一片。

產後編下

誤破尿胞第十八

胞破。女科下卷。產理不順。穩婆不精。誤破尿胞膀胱者。用參芪爲君。歸芎爲臣。桃仁陳皮茯苓爲佐。猪羊尿胞煎藥。百服乃安。又方云。用生黃絲絹一尺。白牡丹皮根爲末。白芨末各二錢。水二碗。煮至另有方。極妥且效。

絹爛如飴。服之宜靜臥。不可作聲。名補脬飲。神效。

患淋第十九

由產後虛弱。熱客於脬中。內虛頻數。熱則小便淋澀作痛曰淋。

茅根湯。凡產後冷熱淋。並治之。

一本小註載症由內虛。方用石膏一兩。無此治法。不可拘執陳方。以致誤人。

石膏。兩。白茅根。兩。瞿麥。白茯苓。錢。各五。葵子。人參。桃膠。滑石。錢。各一。石首魚頭。個。四。

燈心水煎。入齒末。空心服。

一本石膏作一錢。無滑石。一作各等分。

又方治產後小便痛淋血。

白茅根。瞿麥。葵子。車前子。通草。以上俱無分量。鯉魚齒。個。一百。水煎服。亦入齒末。

按齒末疑均是鯉魚齒。

便數第二十

由脬內素有冷氣。因產發動。冷氣入脬故也。用赤石脂二兩爲末。空心服。又方。治小便數及遺尿。用益智仁二十八枚爲末。米飲送下二錢。

又桑螵散

桑螵蛸三十個

人參

黃芪

鹿茸

牡蠣

赤石脂各三錢

爲末。空心服二錢。米飲送下。

瀉第二十一

產後泄瀉。非雜症。有食泄。溼泄。水穀注下之論。大率氣虛食積與溼也。氣虛宜補。食積宜消。溼則宜燥。然惡露未淨。遽難驟燥。當先服生化湯二三帖。化舊生新。加茯苓以利水道。俟血生然後補氣以消食。燥溼以分利水道。使無滯澀虛虛之失。若產旬日外。方論雜症。尤當論虛實而治也。如痛下清水。腹鳴。米飲不化者。以寒泄治。如糞水黃赤。肛門作痛。以熱泄治之。有因飲食過多。傷脾成泄。氣臭如敗卵。以食積治之。又有脾氣久虛少食。食下卽鳴急。盡下所食之物。方覺快者。以虛寒泄治之。治法寒則溫之。熱則清之。脾傷食積。分利健脾。兼消補虛。善爲調治。無失也。產後虛瀉。眠昏人不識。弱甚形脫。危症。必用人參二錢。白朮茯苓各二錢。附子一錢。方能回生。若脈浮弦。按之不鼓。卽爲中寒。此蓋陰先亡而陽欲去。速宜大補氣。

血加附子黑薑以回元陽萬勿忽視。

加減生化湯治產後塊未消患瀉症。

川芎錢二錢二茯苓錢二錢二當歸錢四錢四黑薑分五分五炙草分五分五桃仁粒十粒十蓮子枚八枚八水煎溫服。

健脾利水生化痰湯治產後塊已除患瀉症。

川芎錢一錢一茯苓半錢半錢歸身錢二錢二黑薑分四分四陳皮分五分五炙草分五分五人參錢三錢三肉果製一個一個白朮七錢七錢澤瀉分八分八

寒瀉加乾薑八分寒痛加砂仁炮薑各八分熱瀉加炒黃連八分瀉水腹痛米飲不化加砂仁八分麥芽山查各一錢瀉有酸噯臭氣加神麴砂仁各八分脾氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮一錢以燥溼脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱却寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮苓附必用之藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒。

完穀不化第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也名殮泄又飲食太過脾胃受傷亦然俗呼水穀痢是也然產方三日內塊未消化此脾胃衰弱參芪朮未可遽加且服生化湯加益智香砂少溫脾氣俟塊消後加參芪朮補氣肉果木香砂仁益智溫胃升麻柴胡清胃氣澤瀉茯苓陳皮以利水爲上策也。

加味生化湯治產後三日內完穀不化塊未消者。

川芎錢一益智錢一當歸錢四黑薑分四炙草分四桃仁粒十茯苓半錢

一本當歸作三錢有棗一枚

參苓生化湯治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱患此症者。

川芎錢一當歸錢二黑薑分四炙草分五人參錢二茯苓錢一白芍炒一錢益智炒一錢白朮二錢肉果一個

一本有蓮子八枚去心棗一枚

瀉水多加澤瀉木通各八分腹痛加砂仁八分渴加麥冬五味子寒瀉加黑薑一錢木香四分食積加神麴麥芽消飯麵砂仁山查消肉食產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣六君子湯加木香四分肉果一個製

痢第二十三

產後七日內外患赤白痢裏急後重頻併最爲難治欲調氣行血而推蕩痢邪猶患產後元氣虛弱欲滋榮益氣而大補虛弱又助痢之邪惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓則善消惡露而兼治痢疾並行而不相悖也再服香連丸以俟一二日後病勢如減可保無虞若產七日外有患褐花色後重頻並虛痢即當加補無疑若產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連芩厚朴芍藥行積之劑

一本作十數日

加減生化湯治產後七日內患痢

川芎^{二錢}、當歸^{五錢}、炙草^{五分}、桃仁^{十二粒}、茯苓^{一錢}、陳皮^{四分}、木香^{磨三分}、紅痢腹痛、加砂仁八分。
青血丸治禁口痢

香連爲末、加蓮肉粉各一兩半、和勻爲丸、酒送下四錢。
凡產三四日後、塊散痢疾少減、共十症、開後依治。

一、產後久瀉。

元氣下陷、大便不禁、肛門如脫、宜服六君子湯、加木香四分、肉果一個、製薑汁五分。

二、產後瀉痢。

色黃、乃脾土真氣虛損、宜服補中益氣湯、加木香肉果。

三、產後傷麵食。

瀉痢宜服生化湯、加神麵、麥芽。

四、產後傷肉食。

瀉痢宜服生化湯、加山查、砂仁。

五、產後胃氣虛弱。

瀉痢完穀不化、當溫助胃氣、宜服六君子湯、加木香四分、肉果一個、製。

一本神效麥芽
下有各一錢

六、產後脾胃虛弱。

四肢浮腫。宜服六君子湯。加五皮散。見後水腫。

七、產後瀉痢。

無后重。但久不止。宜服六君子湯。加木香、肉果。

八、產後赤白痢。

臍下痛。當歸、厚朴、黃連、肉果、甘草、桃仁、川芎。

九、產後久痢。

色白屬血虛。宜四物湯。加荊芥、人參。

十、產後久痢。

色赤屬氣虛。宜六君子湯。加木香、肉果。

霍亂第二十四

由勞傷氣血。臟腑空虛。不能運化食物。及感冷風所致。陰陽升降不順。清濁亂於脾胃。冷熱不調。邪正相搏。上下爲霍亂。

生化六和湯治產後血塊痛未除。患霍亂。

一本有附子五分

川芎錢二當歸錢四黑薑炙草陳皮藿香分各四砂仁分六茯苓錢一薑三片煎

附子散治產後霍亂吐瀉手足逆冷須無塊痛方可服

白朮錢一當歸錢二陳皮黑薑丁香甘草分各四共爲末粥飲送下二錢

溫中湯治產後霍亂吐瀉不止無塊痛者可服

人參錢一白朮半錢當歸錢二厚朴分八黑薑分四茯苓錢一草豆蔻分六薑三片水煎服

嘔逆不食第二十五

產後勞傷臟腑寒邪易乘於腸胃則氣逆嘔吐而不下食也又有瘀血未淨而嘔者亦有痰氣入胃胃口不清而嘔者當隨症調之

加減生化湯治產婦逆不食嘔

川芎錢一當歸錢三黑薑砂仁藿香分各五淡竹葉片七水煎和薑汁二匙服

溫胃丁香散治產後七日外嘔逆不食

當歸錢三白朮錢二黑薑分四丁香分四人參錢一陳皮分五炙草分五前胡分五藿香分五薑三片水煎服

石蓮散治產婦嘔吐心冲目眩

石蓮子去殼去心白茯苓兩一丁香分五共爲細末米飲送下

一本有白朮無白茯苓丁香作五錢用者酌之

生津益液湯治產婦虛弱口渴氣少由產後血少多汗內煩不生津液

人參 麥冬去心 茯苓各一兩 大棗 竹葉 浮小麥 炙草 括蕤根 大渴不止加蘆根

一本人參一錢
麥冬茯苓二錢
存參

咳嗽第二十六

治產後七日內外感風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒勿用麻黃以動汗嗽而脅痛勿用柴胡湯嗽而有聲痰少面赤勿用涼藥凡產有火嗽有痰嗽必須調理半月後方可用涼藥半月前不當用

加味生化湯治產後外感風寒咳嗽及鼻塞聲重

川芎錢一 當歸錢二 杏仁粒十 桔梗分四 知母分八

知母一本作四分

有痰加半夏麴虛弱有汗咳嗽加人參總之產後不可發汗

加參安肺生化湯治產後虛弱旬日內外感風寒咳嗽聲重有痰或身熱頭痛及汗多者

川芎錢一 人參錢一 知母錢一 桑白皮錢一 當歸錢二 杏仁皮尖 甘草分四 桔梗分四 半夏分七 橘紅分三

虛人多痰加竹瀝一杯薑汁半匙

加味四物湯治半月後乾嗽有聲痰少者

川芎 白芍 知母 瓜蒌仁錢各一 生地 當歸錢各二 訶子錢二 冬花分六 桔梗分四 甘草分四 兜

鈴分生薑一大片。

水腫第二十七

產後水氣手足浮腫。皮膚見光榮色。乃脾虛不能制水。腎虛不能行水也。必以大補氣血爲先。佐以蒼朮、白朮、茯苓補脾。壅滿用陳皮、半夏、香附消之。虛人加人參、木通。有熱加黃芩、麥冬。以清肺金。健脾利水。補中益氣湯。七日用。人參、白朮各二錢。茯苓、白芍各一錢。陳皮五分。木瓜八分。紫蘇、木通、大腹皮、蒼朮、厚朴各四分。大便不通。加郁李仁、麻仁各一錢。如因寒邪溼氣傷脾。無汗而腫。宜薑皮、半夏、蘇葉。加於補氣方以表汗。

五皮散治產後風溼客傷脾經。氣血凝滯。以致面目浮虛。四肢腫脹。氣喘。

五加皮。地骨皮。大腹皮。茯苓皮。錢各一。薑皮。錢一。棗一枚。水煎服。

又云。產後惡露不淨。停留胞絡。致令浮腫。若以水氣治之。投以甘遂等藥。誤矣。但服調經散。則血行而腫消矣。

調經散

此方能調經。治腹痛。

沒藥。另研。各一錢。琥珀。另研。各一錢。肉桂。赤芍。當歸。錢各一。

右爲細末。每服五分。薑汁、酒、各少許調服。

流注第二十八

產後惡露流於腰臂足關節之處。或漫腫。或結塊。久則腫起作痛。肢體倦怠。急宜用葱熨法。以治外腫。內服參歸生化湯。以消血滯無緩也。未成者消。已成者潰。

葱熨法

用葱一握。炙熱搗爛作餅敷痛處。用厚布二三層。以熨斗火熨之。

參歸生化湯

川芎半錢

當歸二錢

炙草五分

人參二錢

黃芪半錢

肉桂五分

馬蹄香二錢

此症若不補氣血。節飲食。慎起居。未有得生者。如腫起作痛。起居飲食如常。是病氣未深。形氣未損。易治。若漫腫微痛。起居倦怠。飲食不足。最難治。或未成膿未潰。氣血虛也。宜服八珍湯。增寒惡寒。陽氣虛也。宜服十全大補湯。補後大熱。陰血虛也。宜服四物湯。加參、朮、丹皮、嘔逆。胃氣虛也。宜服六君子湯。加炮薑、乾薑。食少體倦。脾氣虛也。宜服補中益氣湯。四肢冷逆。小便頻數。腎氣虛也。補中益氣湯。加益智仁一錢。神仙迴洞散。治產後流注惡露。日久成腫。用此宜導其膿。若未補氣血旺。不可服此方。

膨脹第二十九

婦人素弱。臨產又勞。中氣不足。胸膈不利。而轉運稽遲。若產後卽服生化湯。以消塊止痛。又服加參生化湯。以健脾胃。自無中滿之症。其膨脹因傷食而誤消。因氣鬱而誤散。多食冷物。而停留惡露。又因血虛。大便燥結。誤下而愈脹。殊不知氣血兩虛。血塊消後。當大補氣血。以補中虛。治者若但知傷食宜消。氣鬱宜散。惡露當攻。便結可下。則胃氣反損。滿悶益增。氣不升降。溼熱積久。遂成膨脹。豈知消導坐於補中。則脾胃強。而所傷食氣消散。助血兼行。大便自通。惡露自行。

如產後中風。氣不足。微滿。誤服耗氣藥而脹者。服補中益氣湯。

人參五錢 當歸五錢 白朮五錢 白茯苓一錢 川芎四錢 白芍四錢 蘿蔔子四分 木香三分

如傷食。誤服消導藥成脹。或脅下積塊。宜服健脾湯。

人參 白朮 當歸各三錢 白茯苓 白芍 神麴 吳萸各一錢 大腹皮 陳皮各四分 砂仁

一本參白朮
俱作一錢。當歸
作二錢。有薑一
片。

麥芽各五分

如大便不通。誤服下藥成脹及腹中作痛。宜服養榮生化湯。

當歸四錢 白芍一錢 白茯苓一錢 人參一錢 白朮二錢 陳皮五分 大腹皮五分 香附五分 菴荅一錢 桃仁十粒

塊痛。將藥送四消丸。屢誤下。須用參歸半斤。大便方通。膨脹方退。凡誤用消食耗氣藥。以致

一本無桃仁。

絕穀長生活命丹屢效方見傷食條

怔忡驚悸第三十

由產憂驚勞倦去血過多則心中跳動不安謂之怔忡若惕然定驚心中怯怯如人將捕之狀謂之驚悸治此二症惟調和脾胃志定神清而病愈矣如分娩後血塊未消宜服生化湯且補血行塊血旺則怔定驚平不必加安神定志劑如塊消痛止後患此宜服加減養榮湯當歸錢二川芎錢二茯神錢一人參錢一棗仁炒錢一麥冬錢一遠志錢一白朮錢一黃芪錢一炙甘草錢一元肉八枚陳皮四分炙草四分薑煎虛煩加竹瀝薑汁去川芎麥冬再加竹茹一團加木香即歸脾湯

養心湯治產後心血不定心神不安

炙黃芪錢一茯神錢八川芎錢八當歸錢二麥冬錢八遠志錢八柏子仁錢一人參錢一炙甘草錢四分五味子十粒

薑水煎服

骨蒸第三十一

宜服保真湯先服清骨散

柴胡梅連湯即清骨散作湯速效

柴胡前胡黃連烏梅去核

各二兩。共爲末聽用。再將豬脊骨一條。豬苦膽一個。韭菜白十根各一寸。同搗成泥。入童便一酒盞。攪如稀糊。入藥末。再搗爲丸。如菉豆大。每服三四十九。清湯送下。如上膈熱多。食後服此方。凡男女骨蒸皆可用之。不專治產婦。

保真湯

一本無麥冬黃連。

黃芪^{六分}。人參^{二錢}。白朮^{二錢}。炙草^{四分}。川芎^{六分}。當歸^{二錢}。天冬^{一錢}。麥冬^{二錢}。白芍^{二錢}。枸杞^{二錢}。黃連^{六分}。黃柏^{六分}。知母^{二錢}。生地^{二錢}。五味^{十粒}。地骨皮^{六分}。棗^{三枚}。去核。水煎服。

加味大造湯治骨蒸勞熱。若服清骨散梅連丸不效。服此方。

人參^{一兩}。當歸^{一兩}。麥冬^{八分}。石斛^{八分}。酒蒸柴胡^{六錢}。生地^{二兩}。胡連^{五錢}。山藥^{一兩}。枸杞^{一兩}。黃柏^{七分}。

一本麥冬石斛。俱作八錢。柴胡五錢。黃柏四分。酒炒。

先將麥冬地黃搗爛。後入諸藥。同搗爲丸。加蒸紫河車另搗焙乾爲末。煉蜜丸。

心痛第三十二

此卽胃脘痛。因胃脘在心之下。勞傷風寒。及食冷物而作痛。俗呼爲心痛。心可痛乎。血不足則怔忡驚悸不安耳。若真心痛。手足青黑色。旦夕死矣。治當散胃中之寒氣。消胃中之冷物。必用生化湯。佐消寒食之藥。無有不安。若綿綿而痛。可按止之。問無血塊。則當論虛而加補也。產後心痛腹痛二症相似。因寒食與氣上攻於心則心痛。下攻於腹則腹痛。均用生化湯。

加肉桂吳萸等溫散之藥也。

加味生化湯

川芎錢一當歸錢三黑薑分五肉桂分八吳萸分八砂仁分八炙草分五
傷寒食加肉桂吳萸傷麵食加神麴麥芽傷肉食加山查砂仁大便不通加肉蓯蓉。

腹痛第三十三

先問有塊無塊。塊痛只服生化湯。調失笑散二錢。加元胡一錢。無塊則是遇風冷作痛。宜服加減生化湯。

川芎錢一當歸錢四黑薑分四炙草分四防風分七吳萸分六白蔻分五桂枝分七
痛止去之。隨傷食物所加。如前。

小腹痛第三十四

產後虛中感寒飲冷。其寒下攻。小腹作痛。又有血塊作痛者。又產後血虛臍下痛者。並治之。以加減生化湯。

川芎錢一當歸錢三黑薑分四炙草分四桃仁粒十

有塊痛者。本方中送前胡散。亦治寒痛。若無塊但小腹痛。亦可按而少止者。屬血虛。加熟

地三錢。前胡、肉桂各一錢。爲末。名前胡散。

虛勞第三十五

指節冷痛。頭汗不止。

人參_{三錢}。當歸_{三錢}。黃芪_{二錢}。淡豆豉_{十粒}。生薑_{三片}。韭白_{一寸}。豬腎_二。

先將豬腎煮熟取汁。煎藥八分。溫服。

遍身疼痛第三十六

一本有或用豬胃一個。先將胃略煮。後再煎湯煮藥。

產後百節開張。血脈流散。氣弱則經絡間血多阻滯。累日不散。則筋牽脈引。骨節不利。故腰背不能轉側。手足不能動履。或身熱頭痛。若誤作傷寒。發表出汗。則筋脈動蕩。手足發冷。變症出焉。宜服趁痛散。

一本無桑寄生。

當歸_錢。甘草。黃芪。白朮。獨活_{各八分}。肉桂_{八分}。桑寄生_錢。牛膝_{八分}。薤白_{五根}。

薑三片。水煎服。

腰痛第三十七

由女人腎位繫胞。腰爲腎腑。產後勞傷腎氣。損動胞絡。或虛未復。而風乘之也。養榮壯腎湯治產後感風寒。腰痛不可轉。

一本有川芎八分。

當歸錢二。防風分四。獨活。桂心。杜仲。續斷。桑寄生。各八分。

生薑三片。水煎服兩帖後痛未止屬腎虛加熟地三錢。

加味大造丸治產後日久氣血兩虛腰痛腎弱方見骨蒸條青蛾丸。

胡桃一本作二十個。

胡桃個十二。破故紙入兩酒炒。杜仲炒去絲。薑汁爲細末煉蜜丸淡醋湯送六十丸。

脅痛第三十八

乃肝經血虛氣滯之故。氣滯用四君子湯加青皮柴胡。血虛用四物湯加柴胡人參白朮。若概用香燥之藥則反傷清和之氣無所生矣。

補肺散治脅痛

山萸。當歸。五味。山藥。黃芪。川芎。熟地。木瓜。白朮。獨活。棗仁。各等

水煎服。

陰痛第三十九

產後起居太早產門感風作痛。衣被難近身體宜用祛風定痛湯。

川芎錢一。當歸錢三。獨活。防風。肉桂。荊芥。各五分。茯苓錢一。地黃錢二。棗二枚。煎服。

又附陰疳。陰蝕。陰中瘡曰蠹瘡。或痛或癢。如蟲行狀。濃汁淋漓。陰蝕幾盡者。由心腎煩鬱。胃

參。一本山黃二錢。當歸二錢。五味。十粒。黃芪八分。川芎六分。熟地錢半。木瓜白朮。各一錢。獨活八分。棗仁一錢。薑一片。無山藥存。

氣虛弱。致氣血流滯。經云。諸瘡痛癢。皆屬於心。治當補心養腎。外以藥薰洗。宜用十全陰疳散。

川芎。當歸。白芍。地榆。甘草。各等分。水五碗。煎二碗。去渣。薰日三夜四。先薰後洗。

一方。用蒲黃一升。水銀二兩。二味調勻搽。

一方。用蝦蟆兔糞。等分爲末。敷瘡。

一方。治疳蟲食下部及五臟。取東南桃枝。輕打頭散。以綿纏之。

一方。用石硫黃末。將縛桃枝燃之。按此條宜與上條合看。燃疑燃之誤。

一方。截一短竹筒。先納陰中。以桃枝燒煙薰之。

惡露第四十

卽係裏兒汚血。產時惡露隨下。則腹不痛而產自安。若腹欠溫煖。或傷冷物。以致惡露凝塊。日久不散。則虛症百出。或身熱骨蒸。食少羸瘦。或五心煩熱。月水不行。其塊在兩脅。動則雷鳴。嘈雜暈眩。發熱似瘧。時作時止。如此數症。治者欲洩其邪。先補其虛。必用補中益氣湯。送三消丸。則元氣不損。惡露可消。加味補中益氣湯。

人參錢一。白朮錢二。當歸錢三。黃芪錢一。白芍錢一。廣皮錢四。甘草錢五。薑棗煎服。

三消丸治婦人死血食積痰三等症。

黃連一兩。一牛用益智仁炒。去渣浸炒。萊菔子錢一兩。五川芎錢五。桃仁粒十。山梔。青皮。三

此方治產後傷食惡露不盡。若初產惡露不下。

宜服生化湯。加

查炭三錢。

每日一帖。連服

四劑妙。

右爲末。蒸餅爲丸。食遠服。用補中益氣湯送下五六十九。或用白朮三錢。陳皮五錢。水一鍾。煎五分送下亦可。

乳瘋第四十一

乳頭屬足厥陰肝經。乳房屬足陽明胃經。若乳房腫。結核色紅。數日外腫痛潰。稠膿。膿盡而愈。此屬膽胃熱毒。氣血壅滯。名曰乳癰。易治。若初起內結小核。不紅不腫不痛。積之歲月。漸大如巉岩山。破如熟榴。難治。治法痛腫寒熱宜發表散邪。痛甚宜疏肝清胃。膿成不潰。用托裏。肌肉不生。膿水清稀。宜補脾胃。膿出及潰。惡寒發熱。宜補血氣。飲食不進。或作嘔吐。宜補胃氣。乳巖初起。用益氣養榮湯。加歸脾湯。間可內消。若用行氣補血之劑。速亡甚矣。瓜蒌散治一切癰疽。並治乳癰。癰者六腑不和之氣。陽滯於陰則生之。

瓜蒌一個。連皮。生甘草錢五。當歸錢三。乳香錢五。沒藥錢五。金銀花錢三。白芷錢一。青皮錢五。

水煎溫服。

回脈散乳癰未潰時服此毒從大便秘出虛人不用。

大黃^{半錢} 白芷^{三分} 乳香^{五分} 木香^{五分} 沒藥^{五分} 穿山甲^{五分} 粉并炒

一本大黃作三錢有人參三錢

共爲末人參二錢煎湯調藥末服。

十全大補湯

人參 白朮 黃芪 熟地^{各三錢} 茯苓^{八分} 甘草^{五分} 川芎^{八分} 金銀花^{三錢}

各二錢

瀉加黃連肉果渴加麥冬五味寒熱往來用馬蹄香搗散凡乳癰服薏苡仁粥好。

又方用烏藥軟白香辣者五錢研水一碗牛皮膠一片同煎七分溫服如孕婦腹內癰此

二方可通用。

又有乳吹乃小兒飲乳口氣所吹乳汁不通壅結作痛不急治則成癰宜速服瓜萋散更

以手揉散之。

風甚第四十二

用山羊血取色新者於新瓦上焙乾研末老酒沖下五六分爲度重者用至八分其效如神。
又用抱不出壳雞子瓦上焙乾酒調服。

加治虛寒危症。用藍鬚子根刮皮。新瓦上焙乾。研末。溫服一錢爲度。雖危可保萬全。

不語第四十三

乃惡血停蓄於心。故心氣閉塞。舌強不語。用七珍散。

人參。石菖蒲。川芎。生地。各一兩。辰砂。五分。防風。錢五。細辛。錢一。

共爲細末。用薄荷湯下一錢。因痰氣鬱結。閉口不語者。用好明礬一錢。水飛過。沸湯送下。

一方。治產後不語。

人參。石蓮子。去心。石菖蒲。各等分。水煎服。

婦人良方云。產後痞。心腎虛不能發聲。七珍散。脾氣鬱結。歸脾湯。脾傷食少。四君子湯。氣血俱虛。八珍湯。不應。獨參湯。更不宜急加附子。蓋補其血以生血。若單用佛手散等破血藥。誤矣。

補編

產後大便不通。用生化湯。內減黑薑加麻仁。脹滿加陳皮。血塊痛。加肉桂元胡。如燥結十日以上。肛門必有燥糞。用蜜棗導之。

煉蜜棗法

用好蜜二三兩。火煉滾至茶褐色。先用溼桌傾蜜。在桌上用手作如棗樣。插肛門。待欲大便。去蜜棗方便。

又方。用麻油。口含竹管入肛門內。吹油四五口。腹內糞和即通。或豬膽亦可。

治產後雞爪風。

桑柴灰。三錢。存性。魚膠。三錢。手指甲。十二個。炒。

共爲末。黃酒送下。取汗即愈。

保產無憂散

當歸。錢半。川芎。錢半。炒黑芥穗。八分。艾葉。七分。麴炒枳殼。六分。炙黃芪。八分。兔絲子。錢四分。羌活。五分。

厚朴。七分。薑炒。川貝母。一錢。去心。白芍。錢二分。甘草。五分。薑三片。溫服。

右方保胎。每月三五服。臨產熱服。催生如神。

治遍體浮腫。是脾虛水溢之過。凡浮腫者可通用。俱神效。

真縮砂仁。四兩。萊菔子。二兩。研末。水浸濃。取汁。浸砂仁候汁盡晒乾。研極細末。每服一錢。漸

加至二錢爲度。淡薑湯送下。

保產神效方

未產能安。臨產能催。偶傷胎氣。腰疼腹痛。甚至見紅不止。勢欲小產。危急之際。一服即愈。再服全安。臨產時。交骨不開。橫生逆下。或子死腹中。命在垂危。服之奇效。

全當歸一分。酒洗錢五。真川芎一分。紫厚朴七分。薑兔絲子一分。酒泡錢五。川貝母二分。煎好錢二。方和入心淨。枳殼六分。炒麵。川羌活六分。荆芥穗八分。黃芪八分。蘼艾五分。醋炒五分。炙草五分。白芍一分。用錢二。酒炒冬。生薑三片。水二鍾。

煎八分。渣水一鍾。煎六分。產前空心預服二劑。臨產隨時熱服。

此乃仙傳奇方。慎勿以庸醫輕加減其分兩。

按保產無憂散。保產神效方。與編首治產謫驗良方俱相同。特引論略別。並存參看可也。

中華民國二十五年六月初版

著者 傅山

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

王雲五主編
叢書集成初編

產 後 編

